

Annali AMD 2008


Indicatori di qualità dell'assistenza diabetologica in Italia

Indicatori --- generali

AMD



Annali AMD 2006



86 centri

Annali AMD 2007



95 centri

Annali AMD 2008



122 centri

Mappa di rappresentatività geografica


La prevalenza del Diabete in Italia:

4,5%




122 Centri – 116 analizzati

205.244 pazienti visti nell'anno 2007



Distribuzione per classificazione di diabete



Il carico assistenziale è legato in modo preponderante al DM2

● Tipo 1 ● Tipo 2 ● Secondario ● Altro


N = 205.244



DM1
N = 12.727


DM2
N = 188.068

Primi accessi su totale visti nel periodo




Ogni anno un numero considerevole di pazienti diabetici si rivolge alle strutture specialistiche.

N= 205.244




**Primi accessi
N= 33.934**

Distribuzione per sesso della popolazione assistita




Nella popolazione assistita presso le strutture specialistiche si registra una lieve predominanza del sesso maschile.

Distribuzione della popolazione assistita per 9 classi di età

La distribuzione per classi di età documenta come oltre la metà degli assistiti superi i 65 anni e un quarto abbia più di 75 anni, ribadendo come il carico assistenziale dedicato alle persone più anziane sia estremamente rilevante.

Primi accessi su totale visti nel periodo


DM1



● Primi Accessi ● Già Noti

DM1: 1.438 su 12.727

DM2




● Primi Accessi ● Già Noti

DM2: 31.407 su 188.068

I nuovi accessi rappresentano una quota molto più rilevante per i pazienti con DM2.


Distribuzione per sesso della popolazione assistita

DM1



● Maschi ● Femmine



DM2



● Maschi ● Femmine

La lieve predominanza del sesso maschile documentata sull'intero campione è parallelamente presente in entrambi i tipi di diabete.

Distribuzione della popolazione assistita per 9 classi di età



Nel DM1 oltre il 50% dei pazienti ha età compresa tra 15-45 anni.

Nel DM2 la casistica è spostata verso fasce di età più elevate, ma non è trascurabile la percentuale di pazienti tra 35-55 anni.

Numero medio di visite / anno per gruppi di trattamento

	DM1	DM2
Solo Dieta	-	2.2
Iporali	-	2.5
Insulina	3.5	3.3
Insulina + Iporali	-	3.2

Il numero medio di visite per gruppo di trattamento riflette chiaramente l'aumento di intensità assistenziale richiesto dal passaggio dalla sola dieta, al trattamento orale, a quello con insulina.

Per i pazienti in trattamento con sola insulina, la frequenza delle visite non sembra differire sostanzialmente tra i due tipi di diabete.

Distribuzione dei trattamenti nei soggetti con DM2

