

P5

ANALISI DEGLI INDICATORI CLINICO-GESTIONALI NELLA REALTÀ DIABETOLOGICA ACISMOM

* Sorice G.P.^a, Di Flaviani A.^b, Semprini R.^a, Priori M.^a, Moreschini A.^b, Penza A.^a, Cammilleri F.^c, Ragonese M.^d

*^aACISMOM C.Negro, Roma; ^bACISMOM P.Togliatti, Roma; ^cASLUmbria2; ^dACISMOM Ospedale San Giovanni Battista, Roma

Premessa: I Centri Diabetologici ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Ordine di Malta) partecipano alla raccolta dati per gli annali AMD. *Scopo del Lavoro:* Analizzare la realtà diabetologica per avviare un processo di analisi della qualità dell'assistenza diabetologica in ACISMOM.

Descrizione Sintetica della Casistica e dei Metodi: Sono stati analizzati dati di 23.834 pazienti affetti da diabete di tipo 2 di 3 Centri Diabetologici con età media 68,7 (F 44,84% M 55,16%). Gli indicatori analizzati sono stati di outcome intermedio e processo.

Risultati e Conclusioni: Tra gli indicatori Risultato Intermedio, l'HbA1c media di Acismom è risultata pari a $7,0 \pm 1,2$ %, mentre la media nazionale (MN) è di $7,5 \pm 1,5$ %. Il dato è confermato dalla differenza di percentuale di pazienti ben compensati, al di sotto del 7% di HbA1c (59,29% in Acismom e 43,8% in MN, con un + 15,49%), e di pazienti mal compensati, con HbA1c al di sopra di 8% (14,72% in Acismom e 27,2% in MN, con un - 12,48%). Il 59,01% dei pazienti ha un colesterolo LDL a target (inferiore a 100 mg/dl), la MN è del 48,1% (+ 10,91%) e soltanto un 6,04% dei pazienti in trattamento con ipocolesterolemizzanti ha un colesterolo LDL superiore a 130 mg/dl (contro il 18,1% della MN). La percentuale di soggetti che nonostante un colesterolo LDL superiore a 130 non viene trattata farmacologicamente è del 7,38%, contro il 57,5% della MN. Il 46,18% dei pazienti ha una pressione a target ($\leq 130/80$), contro il 17,4% della MN. I pazienti non a target in trattamento antiipertensivo ($\geq 140/90$) sono il 30,22%, contro il 56,8% della MN, mentre i pazienti non in trattamento e non a target sono il 20,39%, contro il 30,2% della MN. Il 35,61% è al di sotto di 27 kg/m² di BMI (contro il 33,6% della MN, con + 2,1%), mentre il 40,01% è obeso (BMI superiore a 30 kg/m²), contro il 41,7% della MN (- 1,69%). Come indicatori di Processo è stata considerata la media di visite/anno. I pazienti in terapia con ipoglicemizzanti orali ricevono 2,36 visite/anno (contro le 2,0 visite/anno della MN), quelli con sola insulina 2,98 (contro le 2,4 visite/anno della MD), quelli in terapia mista, insulina + ipoglicemizzanti orali, 2,69 (contro 2,5 visite/anno della MN). I dati dimostrano la forza e l'efficacia del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di Acismom, centrato sulla persona, con guadagno di salute per il paziente in una corretta e moderna visione di Chronic Care Model.

